

Očkovanie s cieľom aktívne posilniť obranyschopnosť proti týmto infekčným chorobám:

**záškrt + tetanus + čierny kašeľ /DiTePe/ + detská obrna /POLIO/-
3.preočkovanie v 13.roku veku dieťaťa/medzi 12.-13.narodeninami /
v nadväznosti na doteraz podané dávky /v 1.a 6.roku veku/**

Očkovacia látka: - hradí zdravotná poisťovňa : **BOOSTRIX polio** GSK, Belgicko

Spôsob podania: vpichom do deltového svalu ramena

Potreba ďalšieho posilňovacieho preočkovania: odporúča sa v dospelom veku preočkovať proti záškrtu a tetanu každých 15 rokov

Očakávateľné, bežné reakcie po očkovaní:

- bolesťivosť ,začervenanie a opuch v mieste vpichu, zdureníe lymf.uzliny
- zvýšená teplota až horúčka, únava, bolesť hlavy , svalov , vracanie, nauzea, nechutenstvo

- ošetrenie bežne zvládne rodič aplikovaním studeného obkladu na miesto podania, prípadne je možná aplikácia protizápalovej utišujúcej masti, celkovo možno podať lieky znižujúce teplotu a zmierňujúce bolesť (*paracetamol, ibuprofen*) v dávke podľa váhy dieťaťa. Spravidla do 2 dní po očkovaní sa príznaky zmierňujú a ustupujú. Pokiaľ by tieto reakcie pretrvávali niekoľko dní bez zlepšenia alebo by sa stupňovali, je treba kontaktovať lekára, ktorý dieťa očkovoal.

Alergická reakcia po očkovaní: zriedkavá - nedá sa dopredu odhadnúť

- ak by k nej došlo – zvyčajne je to **do 30 minút** od podania očkovacej látky - prejavy sú **svrbivá vyrážka, opuch očí a tváre, sťažené dýchanie a hltanie** - nutné je vyhľadať neodkladnú lekársku pomoc !! - v očkovaní ďalších dávok sa už nesmie pokračovať

Vystupňované reakcie po očkovaní: vyskytujú sa veľmi vzácne, približne 1 na 10 000 podaných dávok (príčinou je neprimeraná reakcia imunitného systému)

- horúčka vyššia ako 40stC
- neutíšiteľný plač dieťaťa trvajúci niekoľko hodín
- začervenanie a opuch v mieste podania vakcíny presahujúci 10-15cm, opuch celej končatiny
- neurologické príznaky – prechodné obrny periférnych nervov, prípadne kŕče
- poruchy krvi

Tieto reakcie je potrebné dôkladne posúdiť, podliehajú hláseniu, spravidla sa riešia v spolupráci s tímom špecialistov a podanie ďalších dávok vakcíny, po ktorej vznikli uvedené príznaky sa individuálne zvažuje.

Po každom očkovaní
je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára.