

### Odporúčané očkovanie nad rámec nariadených očkovaní, na žiadosť rodiča

V prípade záujmu o vakcináciu nad rámec povinného očkovania kontaktujte našu ambulanciu.

Dieťa by malo byť zdravé, s dostatočným odstupom od predchádzajúceho ochorenia.

So sestričkou si dohodnete termín na zaočkovanie dieťaťa

a bude Vám vystavený recept, na základe ktorého zakúpite konkrétnu vakcínu v lekárni.

Výkon očkovania na žiadosť, s výnimkou očkovania proti chrípke, nie je hrazený zdravotnou poisťovňou, uhrádza ho rodič podľa aktuálne platného cenníka ambulancie.

### Po každom očkovaní

je potrebné zotrvať 30 min. v čakárni ambulancie očkujúceho lekára.

## Aktívna ochrana - proti rotavírusovej infekcii

- očkovanie je určené pre **deti do 6 mesiacov veku** – očkovanie chráni dieťa hlavne v období do 2 rokov veku, ale istá imunologická pamäť pretrváva dlhodobejšie, z čoho očkované dieťa profituje aj dlhodobejšie tak, že pri kontakte s vírusom neochorie, resp. ochorenie má podstatne miernejší priebeh,

- priebeh rotavírusových hnačiek môže byť u malých detí závažný – často s potrebou hospitalizácie na zabezpečenie dostatočného zavodnenia cestou infúzií pri väčších stratách tekutín riedkymi stolicami vracaním a pri horúčke,

- **najvyšší výskyt** rotavírusových hnačiek je **vo veku 6-24 mesiacov**

- do 5.rokov veku prekoná rotavírusovú hnačku 95% detí

- prameňom nákazy je **chorá osoba /dieťa alebo dospelý/ a rekonvalescent**

- prenos ochorenia je **fekálno-orálnou cestou** /teda požitím vírusu cestou znečistených rúk, hračiek, predmetov, vírus sa lepí aj na odev/ a **vdýchnutím infikovaných kvapôčok** pri kontakte s chorým

- inkubačná doba je 1-3 dni.

Rotavírusová infekcia patrí medzi najčastejšie nákazy získané pri pobyte v nemocnici, počas cestovateľských aktivít, resp. voľnočasových aktivít s deťmi /návštevy verejných kúpalísk, plavární, telocviční, detských kútikov a herní/.

Pokiaľ má dieťa v dojčenskom veku staršieho súrodenca hlavne – škôlkára – ktorý nie je očkovaný proti rotavírusovej infekcii, alebo ju neprekonal, je dobré zvážiť zaočkovanie takého dojčaťa.

- očkovacia látka obsahuje **živý, oslabený vírus**, podávaný cez ústa, na trhu sú dostupné 2 vakcíny s 2-3 dávkovou schémou podania /odstupy najmenej 4 týždne/– očkovanie sa môže začať najskôr vo veku 7 týždňov /ukončený 6.týždeň života/ - **musí byť skončené do veku 24 týždňov /ROTARIX – podávajú sa 2 dávky/ resp. 32 týždňov /ROTATEQ-podávajú sa 3 dávky/ podľa typu použitej očkovacej látky.** Vakcína môže byť podaná aj v deň očkovania hexavakcínou a pneumokokovou vakcínou. Uprednostňujeme však oddelené podanie.

- **očkovanie sa nemôže podať** deťom s precitlivosťou na vakcínu, vrodenou vývojovou chybou zažívacieho systému, dojčatám so známym, alebo predpokladaným oslabením imunity, akútnym horúčkovým ochorením, vracaním a hnačkou

- **zriedkavé vedľajšie účinky očkovania** – podráždenosť, plač, porucha spánku, chrapot, výtok z nosa, nechutenstvo, hnačka, vracanie, bolesť bruška, zápcha, porucha peristaltiky čriev, bolesť svalov, vyrážka, horúčka, svalové kŕče

- dieťa po očkovaní vírus vylučuje v malom množstve krátke obdobie stolicou – preto by si v období do 14 dní po očkovaní mali dať pozor osoby s výrazne oslabenou imunitou žijúce v spoločnej domácnosti s očkovaným dieťaťom a neprichádzať do kontaktu priamo so stolicou dieťaťa, neprebaľovať ho a umývať si dôkladne ruky

- očkovaciu látku hradí rodič, zo zdravotného poistenia môže byť kompenzovaná časť sumy, bližšie info získate v zdravotnej poisťovni dieťaťa, podmienky úhrady z poistenia sa môžu meniť.  
Výkon očkovania je spolplatnený podľa aktuálneho cenníka ambulancie.